

レジメン番号	0894	レジメン名	リツキサン療法(全身性強皮症)
登録診療科	リウマチ・膠原病内科	使用薬剤	リツキサン
がん腫	全身性強皮症	インターバル日数	7 日

#### 【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 ( / )	・Day7	Day1 ( / )
リツキサン 375 mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	1週間を1コース	↓

#### 【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釀液/量	投与速度/方法
①リツキサン	100mg	生食で 10 倍希釀	医師の指示通り/輸注ポンプ
	500mg		
②5%ブドウ糖	500mL		メインルート/点滴
③生食	50mL		ブッシュ用/点滴

## 【備考】

- ・本治療の投与回数は4回までとする。
  - ・インフュージョンリアクション軽減対策として、リツキサン投与30分前に「アセトアミノフェン500mg1T+ポララミン2mg1T」又は同等の抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤を、30分前に投与する。
  - ・※リツキサン投与速度

【初回投与】最初の30分50mL/hrで開始、その後30分毎に50mL/hrずつ上げて、最大400mL/hrで投与可。

【2回以降】初回投与時の副作用が軽微であった場合は、100mL/hrで開始、その後30分毎に50mL/hrずつ上げて、最大400mL/hrで投与可。