


レジメン番号	0895	レジメン名	リツキサン療法/リツキシマブ BS 療法
登録診療科	リウマチ・膠原病内科	使用薬剤	リツキサン/リツキシマブ BS
がん腫	ループス腎炎	インターバル日数	7 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day7	Day1 (/)
リツキサン又はリツキシマブ [®] BS 375 mg/m ²	点滴	mg	↓	1 週間を 1 コース	↓

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①リツキサン又はリツキシマブ [®] BS	100mg	生食で 10 倍希釈	医師の指示通り/輸注ポンプ
	500mg		
②5%ブドウ糖	500mL		メインルート/点滴
③生食	50mL		フラッシュ用/点滴



- 【備考】
- ・ 本治療の投与回数は 4 回までとする。
 - ・ 原則として、副腎皮質ステロイド剤を併用する。
 - ・ リツキサン/リツキシマブ BS いずれを使用するかは、任意で医師が選択可能。(適応両剤共にあり)
 - ・ インフュージョンリアクション軽減対策として、リツキシマブ投与 30 分前に「アセトアミノフェン 500 mg 1T +ポララミン 2mg1T」又は同等の抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤を、30 分前に投与する。
 - ・ ※リツキシマブ投与速度
- 【初回投与】最初の 30 分 50mL/hr で開始、その後 30 分毎に 50mL/hr ずつ上げて、最大 400mL/hr で投与可。
- 【2 回以降】初回投与時の副作用が軽微であった場合は、100mL/hr で開始、その後 30 分毎に 50mL/hr ずつ上げて、最大 400mL/hr で投与可。