

レジメン番号	0899	レジメン名	IsaVRd 療法 Cycle5-17
登録診療科	血液内科	使用薬剤	サークリサ、デキサート、レナリドミド
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 ( / )	... ↓	Day15 ( / )	Day21 ( / )	...Day28	Day1 ( / )
サークリサ 10mg/kg	点滴	mg	↓		↓		4週間を 1コース	↓
デキサート 20mg/body	点滴	mg	↓		↓			↓
レナリドミド 25mg/body	内服	mg	↓	↓	↓	↓		↓

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	※/輸注ポンプ
	500mg		
②デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴
③生食	50mL		5 分/点滴

《Day1,15》

投与間隔	(emainルート /50mL/h)	(15 分)	(※)	(5 分)
サークリサ開始 15~60 分間に服用				
投与順番	④ → ② → ① → ③			
・アセトアミノフェン 500mg 2T ・ポルタミン 2mg 1T ・ファモチジン OD20mg 1T				終了

【備考】

④生食 100mL メインルート (Day1,15)

③デキサメタゾン : 20mg/日 (Day1,8,15,22) デキサートはデキサメタゾン内服でも可

サークリサ投与日は点滴、その他の日は内服で投与

①サークリサ : ※初回 25mL/h(1h)より徐々に速度調整

2回目 50mL/h(30min)より徐々に速度調整

3回目以降 200mL/h

レナリドミド : 25mg/日 day1-21