

レジメン番号	0905	レジメン名	IsaVRd lite 療法 Cycle1
登録診療科	血液内科	使用薬剤	サークリサ、デキサート、ボルテゾミブ、レナリドミド
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	42 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day21 (/)	Day22 (/)	…Day42
ボルテゾミブ 1.3mg/m ²	皮下	mg	↓	↓	↓			4 週間を 1 コース
サークリサ 10mg/kg	点滴	mg	↓	↓	↓		↓	
デキサート 20mg/body	点滴	mg	↓	↓	↓		↓	
レナリドミド 25mg/body	内服	mg	↓	↓	↓	↓		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ボルテゾミブ	3mg	生食 1.2mL	皮下注
②サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	※/輸注ポンプ
	500mg		
③デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴
④生食	50mL		5 分/点滴

《Day1,8,15》

投与間隔》

(メインルート
/50mL/h)
(15 分)
(皮下注)
(※)
(5 分)

投与順番》

サークリサ開始 15～60 分間前に服用
・アセトアミノフェン 500mg 2T
・ポ ララミン 2mg 1T
・ファモチジン OD20mg 1T

⑤
→
③
→
①
→
②
→
④
→
終了

《Day22》

投与間隔》

(メインルート
/50mL/h)
(15 分)
(※)
(5 分)

投与順番》

サークリサ開始 15～60 分間前に服用
・アセトアミノフェン 500mg 2T
・ポ ララミン 2mg 1T
・ファモチジン OD20mg 1T

⑤
→
③
→
②
→
④
→
終了

【備考】

⑤生食 250mL メインルート (Day1,8,15,22)

③デキサメタゾン：20mg/日 デキサートはデキサメタゾン内服でも可

②サークリサ：※初回 25mL/h(1h)より徐々に速度調整

2 回目 50mL/h(30min)より徐々に速度調整

3 回目以降 200mL/h

レナリドミド：25mg/日 Day1-21