

レジメン番号	0906	レジメン名	IsaVRd lite 療法 Cycle2-12
登録診療科	血液内科	使用薬剤	サークリサ、デキサート、ボルテゾミブ、レナリドミド
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

### 【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	Day15 ( / )	Day21 ( / )	…Day28	Day1 ( / )
ボルテゾミブ 1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下	mg	↓	↓	↓		4週間を 1コース	↓
サークリサ 10mg/kg	点滴	mg	↓		↓			↓
デキサート 20mg/body	点滴	mg	↓		↓			↓
レナリドミド 25mg/body	内服	mg	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓		↓ ↓

### 【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ボルテゾミブ	3mg	生食 1.2mL	皮下注
②サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	※/輸注ポンプ
	500mg		
③デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴
④生食	50mL		5 分/点滴

### 《Day1,15》

投与間隔》 (メインルート  
/50mL/h) (15 分) (皮下注) (※) (5 分)

サークリサ開始 15~60 分間前に服用

投与順番》 ⑤ → ③ → ① → ② → ④ → 終了

- ・アセトアミノフェン 500mg 2T
- ・ボラジン 2mg 1T
- ・ファモチジン OD20mg 1T

### 《Day8》

投与間隔》 (皮下注)

投与順番》 ① → 終了

### 【備考】

⑤生食 250mL メインルート (Day1,15)

③デキサメタゾン : 20mg/日 デキサートはデキサメタゾン内服でも可

②サークリサ : ※初回 25mL/h(1h)より徐々に速度調整

2 回目 50mL/h(30min)より徐々に速度調整

3 回目以降 200mL/h

レナリドミド : 25mg/日 Day1-21