

レジメン番号	0925	レジメン名	アミバンタマブ+ラゼ [®] ルチニブ [®] ＜80 kg C1 療法
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	ライブリバント、ラズクルーズ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	…Day28
ラズクルーズ（ラゼ [®] ルチニブ） 240mg/日	内服	mg	連日内服					
ライブリバント	点滴	mg	↓350mg	↓700mg	↓1050mg	↓1050mg	↓1050mg	4 週間を 1 コース

支持療法

デキサート 9.9mg/ body	点滴	9.9mg	↑	↑	↑	↑	↑	4 週間を 1 コース
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	↑	↑	↑	↑	
ポララミン 5mg/body	点滴	5mg	↑	↑	↑	↑	↑	

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ライブリバント		350mg	総量 250mL	※下記参照
②	ファモチジン	20mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ポララミン	5mg		
	デキサート	9.9mg		
③	生食	100mL		30 分/点滴
④	生食	50mL		5 分/点滴

【当日の投与方法】

時間≫

(15 分)

(30 分)

(※下記参照)

(5 分)

投与順≫

②

→

③

→

①

→

④

→

終了

【備考】

※day1.2：50mL/h 投与開始 2 時間後 75mL/h へ速度を上げることができる。

day8：85mL/h、day15.22：125mL/h の速度で投与する。

ライブリバント：前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用

【支持療法 処方セット】

- ・デキサメタゾン（デカドロン）：4mg 4錠 1 日 2 回服用（投与開始 2 日前より内服開始）2 日分（C1D1 のみ）
- ・アピキサバン（エリキュース）：2.5mg 2錠 1 日 2 回服用（投与開始 4 か月間は予防投与、その後必要に応じて継続）
- ・ミノサイクリン：50mg 2錠/2×N 朝・夕（治療開始 12 週間予防投与、その後は必要に応じて継続検討）
- ・メトクロプラミド：5mg 1錠/吐き気がする時
- ・ロペラミド 1mg 1 カプセル/下痢時
- ・ヒルドイドソフト軟膏：1 日 3 回カサカサへ
- ・ヒルドイドローション：1 日 3 回カサカサへ
- ・リドメックス軟膏：1 日 3 回 顔/皮疹が出現したとき
- ・リドメックスローション：1 日 3 回 頭/皮疹が出現したとき
- ・ベタメタゾン軟膏：1 日 3 回 胸、胴、腕、足/皮疹が出現したとき
- ・オルテクサー口腔用軟膏：1 日 3 回 口内炎が出たとき