

レジメン番号	0926	レジメン名	アミバントマブ+ラゼルチニブ <80 kg C2-療法
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	ライブリバント、ラゼルチニブ
がん腫	肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・Day14	Day1 (/)
ラズクルーズ (ラゼルチニブ) 240mg/日	内服	mg		連日内服	↓
ライブリバンド 1050mg/body	点滴	1050mg	↓	2週間を1コース	↓

支持療法

<u>デキサート 9.9mg/ body</u>	点滴	9.9mg	↑		↑
<u>ガスター 20mg/body</u>	点滴	20mg	↑	2週間を1コース	↑
<u>ポララミン 5mg/body</u>	点滴	5mg	↑		↑

《藥劑調製》

薬品名	規格	希釀液/量	投与速度/方法
①ライブリバンド	350mg	総量 250mL	125mL/h
②	ガスター	20mg	15 分/点滴
	ポララミン	5mg	
	デキサート	3.3mg	
③ 生食	100mL		30 分/点滴
④ 生食	50mL		5 分/点滴

時間》 ② (15分) → ③ (30分) → ① (125mL/h) → ④ (5分) → 終了
投与順》

【備考】

ライブリバント：前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用

【支持療法　処方セット】

- ・アピキサバン（エリキュース）：2.5mg 2錠1日2回服用（投与開始4か月間は予防投与、その後必要に応じて継続）
 - ・ミノサイクリン：50mg 2錠/2xN 朝・夕（治療開始12週間予防投与、その後は必要に応じて継続検討）
 - ・メトクロプラミド：5mg 1錠/吐き気がする時
 - ・ロペラミド 1mg 1カプセル/下痢時
 - ・ヒルドイドソフト軟膏：1日3回カサカサへ
 - ・ヒルドイドローション：1日3回カサカサへ
 - ・リドメックス軟膏：1日3回 顔/皮疹が出現したとき
 - ・リドメックスローション：1日3回 頭/皮疹が出現したとき
 - ・ベタメタゾン軟膏：1日3回 胸、胴、腕、足/皮疹が出現したとき
 - ・オルテクサーロ腔用軟膏：1日3回 口内炎が出たとき