

レジメン番号	0927	レジメン名	アミバンタブ + ラゼルチニブ $\geq 80\text{ kg}$ C1 療法
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	ライブリバント、ラズクルーズ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2 ( / )	Day8 ( / )	Day15 ( / )	Day22 ( / )	…Day28
ラズクルーズ (ラゼルチニブ) 240mg/日	内服	mg				連日内服		
ライブリバント	点滴	mg	↓350mg	↓1050mg	↓1400mg	↓1400mg	↓1400mg	4週間を1コース

支持療法

デキサート 9.9mg/ body	点滴	9.9mg	↑	↑	↑	↑	↑	4週間を1コース
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	↑	↑	↑	↑	
ポララミン 5mg/body	点滴	5mg	↑	↑	↑	↑	↑	

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ライブリバント	350mg	総量 250mL	※下記参照
② ファモチジン ポララミン デキサート	20mg	生食 100mL	15分/点滴
	5mg		
	9.9mg		
③ 生食	100mL		30分/点滴
④ 生食	50mL		5分/点滴

時間》 (15分) (30分) (※下記参照) (5分)  
投与順》 ② → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

※day1 : 50mL/h 投与開始 2 時間後 75mL/h へ速度を上げることができる。

day2 : 35mL/h 投与開始 2 時間後 50mL/h へ速度を上げることができる。

day8 : 65mL/h、day15 : 85mL/h 、day22 : 125mL/h の速度で投与する。

ライブリバント : 前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用

【支持療法 処方セット】

- ・デキサメタゾン (デカドロン) : 4mg 4錠 1日 2回服用 (投与開始 2日前より内服開始) 2日分 (C1D1のみ)
- ・アピキサバン (エリキュース) : 2.5mg 2錠 1日 2回服用 (投与開始 4か月間は予防投与、その後必要に応じて継続)
- ・ミノサイクリン : 50mg 2錠/2xN 朝・夕 (治療開始 12週間予防投与、その後は必要に応じて継続検討)
- ・メトクロプラミド : 5mg 1錠/吐き気がする時
- ・ロペラミド 1mg 1カプセル/下痢時
- ・ヒルドイドソフト軟膏 : 1日 3回カサカサへ
- ・ヒルドイドローション : 1日 3回カサカサへ
- ・リドメックス軟膏 : 1日 3回 顔/皮疹が出現したとき
- ・リドメックスローション : 1日 3回 頭/皮疹が出現したとき
- ・ベタメタゾン軟膏 : 1日 3回 胸、胴、腕、足/皮疹が出現したとき
- ・オルテクサロ腔用軟膏 : 1日 3回 口内炎が出たとき