

成人

インフルエンザ確定・疑われる患者で  
抗インフルエンザ薬の投与をする場合には

重症時

妊婦・授乳婦

アドヒアランスが悪い場合

第一選択

オセルタミビルカプセル75mg (タミフル)

腎機能により調節必要

30 < CCr : 2カプセル/分2 5日分

10 < CCr ≤ 30 : 1カプセル/分1 5日分

CCr ≤ 10、透析時 : 1カプセル 1回のみ (透析時は透析後)

第二選択

リレンザパッケージ (4ブリスト-×5マイ) 1組/1日2回

ラピアクタ点滴静注300mg

15分かけて点滴静注

腎機能により調節必要

50 ≧ CCr : 1袋 (300mg/60mL)

30 ≧ CCr < 50 : 0.33袋 (100mg/20mL)

10 ≧ CCr < 30 : 0.17袋 (50mg/10mL)

呼吸状態の悪い場合は、  
吸入薬は使用しない

イナビル吸入粉末剤 2個/1回分

# 小児

インフルエンザ確定・疑われる患者で  
抗インフルエンザ薬の投与をする場合には

5歳未満

## 第一選択

オセルタミビルド ライシロップ<sup>®</sup> (タミフル)

生後2週～1歳未満：6mg/kg/日 分2 5日間

1-4歳：4mg/kg/日 分2 5日間

5歳未満は吸入困難と考える

5歳以上

重症時

ラピアクタ点滴静注

1日1回10mg/kg

15分かけて点滴静注

## 第一選択

オセルタミビルド ライシロップ<sup>®</sup> (タミフル)

オセルタミビルカプセル75mg (タミフル)

4mg/kg/日 分2 5日間

## 第二選択

吸入できるか、確認して

リレンザパッケージ (4ブリスト-×5マイ) 1組/1日2回

## 第三選択

吸入できるか、確認して

イナビル吸入粉末剤 10歳以上 2個/1回分

10歳未満 1個/1回分

呼吸状態の悪い場合は、吸入薬は使用しない