

【慢性便秘症における緩下剤フォーミュラリー】

* 専門に見られている診療科についてはこの限りではありません

成人

通常
(右記に該当しない)

高齢者
65歳以上

全身状態
不良

腎障害

軽度・
中等度

高度腎機能障害
eGFR:30mL/min/
1.73m²未満

マグミット

[5.7円/330mg錠、3.56円/0.4g包]

腎障害時・高齢者・全身状態不良の場合は
3ヶ月に一度
長期投与の場合にも定期的な血中Mg濃度測定

はい

少なくとも3ヶ月に一度の
血中Mg検査の実施が可能

いいえ

マグミット使用が難しい場合

- ①モビコール内用剤 LD2包 = HD1包
7歳以上: LD [65.7円/包]・HD(院外)[117.8円/包]
7歳未満: LD [65.7円/包]
- ②ラグノスゼリー [49.4円/包]

効果不十分な場合

効果不十分な場合

オピオイドを使用している

はい

いいえ

- ①アミティーザ [12μg: 49.9円/カプセル 24μg: 100円/カプセル]
- ②リンゼス [69.1円/錠] ※食前投与
- ③グーフィス [84.2円/錠] ※食前投与

- ① スインプロイク [277.1円/錠]
- ② アミティーザ [左記参照]

頓用 (定期内服は耐性の懸念があるため、推奨しない)

センノシド (プルゼニド)、ピコスルファート(ラキソベロン)、大黃甘草湯
麻子仁丸、グリセリン浣腸、レシカルボン坐剤、テレミンソフト坐剤

2024.4改訂
藤田医科大学病院