

HMG-CoA還元酵素阻害薬フォーミュラー

高脂血症診断
生活習慣の改善でも
脂質管理が不十分な場合

シクロスポリン（ネオーラル）の併用

なし

急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸

なし

あり

すべて strongスタチン

	薬価	開始用量	最高用量
--	----	------	------

第一推奨	ロスバスタチンOD錠2.5mg (先発品名：クレストール)	11.4円	2.5-5mg 20mg (CCr<30:5mg)
-------------	-----------------------------------------	-------	---------------------------------

- 水溶性ストロングスタチンで、相互作用が少ない
- 用量幅が大きく調節しやすい
- 安価

第二推奨	ピタバスタチンOD錠2mg (先発品名：リバロ)	17.8円	1-2mg 4mg
	アトルバスタチン錠10mg (先発品名：リピトール)	15.8円	10mg 20mg (家族性40mg)

あり

standardスタチン

薬価	開始用量	最高用量
----	------	------

プラバスタチン錠10mg (先発品名：メバロチン)	15.4円	10mg 20mg
-------------------------------------	-------	--------------

- 水溶性スタチン・重篤な肝障害時に唯一使用できるスタチン

strongスタチン

	薬価	開始用量	最高用量
--	----	------	------

第一推奨	フルバスタチン錠20mg (先発品名：ローコール)	19.9円	20mg 60mg
-------------	-------------------------------------	-------	--------------

- シクロスポリンとの相互作用が少ない（他剤は禁忌または血中濃度10倍程度上昇のためNG）