

HMG-CoA還元酵素阻害薬フォーミュラー

高脂血症診断
生活習慣の改善でも
脂質管理が不十分な場合

シクロスポリン（ネオーラル）の併用

なし

急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸

なし

あり

すべて strongスタチン

第一推奨	ロスバスタチンOD錠2.5mg (先発品名：クレストール)	10.4円	2.5-5mg	20mg (CCr<30:5mg)
------	----------------------------------	-------	---------	----------------------

- 水溶性ストロングスタチンで、相互作用が少ない
- 用量幅が大きく調節しやすい
- 安価

第二推奨	ピタバスタチンOD錠2mg (先発品名：リバロ)	15.9円	1-2mg	4mg
	アトルバスタチン錠10mg (先発品名：リピトール)	13.9円	10mg	20mg (家族性40mg)

あり

standardスタチン	薬価	開始用量	最高用量
プラバスタチン錠10mg (先発品名：メバロチン)	14.1円	10mg	20mg
水溶性スタチン・重篤な肝障害時に唯一使用できるスタチン			

standardスタチン		薬価	開始用量	最高用量
第一推奨	フルバスタチン錠20mg (先発品名：ローコール)	19.9円	20mg	60mg

シクロスポリンとの相互作用が少ない（他剤は禁忌または血中濃度10倍程度上昇のためNG）