

成人

インフルエンザ確定・疑われる患者で
抗インフルエンザ薬の投与をする場合には

重症時

妊婦・授乳婦

腎機能正常

CCr10を超える
腎機能障害

透析
患者

非透析
かつ
CCr10以下

アドヒアランスが
悪い場合

【第一選択薬】オセルタミビル（タミフル）

腎機能により調節必要

CCr30を超える : 2錠(150mg)/分2 5日分

CCr10を超え30以下 : 1錠 (75mg) /分1 5日分

透析時 : 直ちに**ドライシロップ1g (30mg)**

その後5日間のうちの透析日に透析後ドライシロップ1g (30mg) 投与

！注意！CCr10以下の非透析時は使用しない。

【第二選択薬】リレンザパッケージ（47 リスター×5マイ）1組/1日2回*

イナビル
吸入粉末剤*
2個/1回分

ゾフルーザ
錠20mg
2錠/1回分
※体重80kg以上
→4錠/1回分

重症時用量で記載

ラピアクタ点滴静注300mg

15分以上かけて点滴静注

腎機能により調節必要

CCr50以上 : 2袋 (600mg/120mL)

CCr30以上50未満 : 0.66袋 (200mg/40mL)

CCr10以上30未満 : 0.33袋 (100mg/20mL)

CCr10未満 : 0.33袋 (100mg/20mL)

症状に応じ、0.05袋 (15mg/3mL) 連日反復投与

透析時 : 0.33袋 (100mg/20mL)

症状に応じ、透析日のみ透析2時間後に同量反復投与

症状に応じ
連日同量反復投与

リレンザパッケージ*

（47 リスター×5マイ）

1組/1日2回

吸入できない場合

*呼吸状態の悪い場合
は吸入薬は使用しない

小児

インフルエンザ確定・疑われる患者で
抗インフルエンザ薬の投与をする場合には

6歳未満

第一選択

タミフルドライシロップ[®] (オセルタミビル)

生後2週～1歳未満：6mg/kg/日 分2 5日間

1-5歳： 4mg/kg/日 分2 5日間

6歳未満は吸入困難と考える

6歳以上

重症時

ラピアクタ点滴静注

1日1回10mg/kg

15分かけて点滴静注

呼吸状態の悪い場合は、
吸入薬は使用しない

第一選択

タミフルドライシロップ[®] (オセルタミビル)

オセルタミビル錠75mg (タミフル)

4mg/kg/日 分2 5日間

第二選択

吸入できるか、確認して

・ リレンザパッケージ (4ブリストア×5マイ)

1組/1日2回

・ イナビル吸入粉末剤
*乳製品アレルギーの場合は慎重投与

10歳以上 2個/1回分

10歳未満 1個/1回分

第三選択

ゾフルーザ錠20mg (注：B型の場合は第一選択でも可)

12歳以上 2錠/1回分

12歳未満 体重40kg以上 2錠/1回分

体重20kg以上40kg未満 1錠/1回分